

1 2



DR SABINE BELLAÏCHE – MÉDECIN ESTHÉTIQUE – PARIS

Correction DES SIGNES DE *l'âge* PAR *l'action combinée* DE **l'acide** **hyaluronique** ET DE LA **radiofréquence** FRACTIONNÉE

OBJECTIF DE LA SÉANCE: **REMODELER** LE VISAGE
EN **RESTRUCTURANT** LES **VOLUMES**.

Après un examen minutieux du patient, le praticien recherche les volumes perdus qui ont engendré un affaissement de la structure: les plus fréquents sont ceux que présente la patiente utilisée comme modèle.

La première étape permet de structurer le 1/3 moyen du visage.

La procédure débute en

redessinant modérément les pommettes pour tracter les tissus (ici on a utilisé du Stylage XL lido), puis on comble les volumes perdus. Dans notre cas, le même produit est utilisé pour remplir la vallée des larmes dont la graisse disparaît avec le temps, ce qui marque le cerne et fait chuter les tissus vers le sillon nasogénien. Afin de redonner son équilibre au visage, le sillon nasogénien

est légèrement comblé, et surtout l'angle formé entre le nez et le sillon nasogénien.

On poursuit le traitement en se concentrant alors sur le 1/3 inférieur du visage.

En suivant la même réflexion, la peau doit être étirée et les volumes comblés de la manière suivante: Un bolus de Stylage XL lido (ou de Stylage XXL) tracte l'ovale du visage, puis on poursuit en comblant le creux mentonnier situé en avant de la bajoue par un bolus profond du même produit. Enfin, pour préciser la netteté de

l'ovale, on augmente modérément le menton; le profil du patient est ainsi nettement amélioré.

Pour cette patiente, le traitement à l'acide hyaluronique s'achève en redessinant la bouche afin qu'elle soit plus en adéquation avec le reste du visage. Ce traitement des lèvres doit permettre de finaliser le remodelage du visage et lui donner encore plus de naturel. Il est pertinent de le faire à ce moment de la prise en charge. Pour un traitement de ce type, et en fonction de la qualité de la peau, on peut utiliser 4 seringues de volumateurs;
Stylage XXL, 1 seringue
Stylage XL lido, 2 seringues
Stylage Lips lido, 1 seringue

Le traitement du haut du visage et de la zone péri-orbitaire se fait en dernier lieu.

L'acide hyaluronique n'est pas le seul outil permettant de corriger les signes de l'âge et n'est pas toujours l'outil le plus adapté. En ce qui concerne le regard, nous avons opté pour un traitement de radiofréquence fractionnée: la **RF Fraxx Loktal** est un outil très performant sur cette zone,

comme en témoigne son action sur cette patiente. Afin d'obtenir l'ouverture du regard et la correction des ridules périorbitaires, 2 séances de RF fractionnée ont permis de relever la paupière supérieure en effectuant un quadrillage de la région supérieure de la queue du sourcil. La radiofréquence fractionnée a pour effet une traction de la paupière par fibrose des tissus en amont. Pour le lissage des rides

périorbitaires, 2 passages de la PAM Fraxx 64 aiguilles ont suffi et ont été particulièrement efficaces.

Certains diront que la toxine botulique aurait été pu être utilisée avec les mêmes effets. Pour ma part, je ne le pense pas car en stoppant la contracture musculaire, elle peut créer, surtout sur ce type de patientes, un regard plus lourd, ce qui serait alors contre-productif.

